

E-LEARNING**LA SINDROME POST-TROMBOTICA:
APPROPRIATEZZA CLINICA E TRATTAMENTO
DELLE COMPLICANZE**

Online dal 15/04/2025 al 31/12/2025

RESPONSABILE SCIENTIFICO**Maurizio Ronconi**

La Sindrome Post Trombotica (SPT) rappresenta la complicanza più comune a lungo termine della trombosi venosa profonda (TVP). Si verifica in una percentuale fino al 20-50% dei pazienti con pregressa TVP, principalmente a causa della ridotta risoluzione del trombo primario, con ostruzione persistente al deflusso venoso e incompetenza valvolare secondaria. L'ipertensione venosa che ne deriva, secondaria all'ostacolato ritorno venoso al cuore, si associa, a lungo termine, ad un sovraccarico linfatico e ad un danno del microcircolo che si traducono, a loro volta, in un "distress" infiammatorio cronico.

Circa il 5-10% dei pazienti affetti da Sindrome Post Trombotica sviluppa una sintomatologia grave con una significativa riduzione della qualità della vita (QoL), simile a quella dei pazienti con cancro, angina o insufficienza cardiaca. I sintomi più frequenti riferiti alla gamba colpita da SPT sono rappresentati da edema, iperpigmentazione cutanea e lipodermatosclerosi, dolore, sino al sovente formarsi di vaste ulcere venose. La SPT incide notevolmente sul costo del trattamento della TVP. Negli USA lo sviluppo di complicanze post SPT incrementa il costo già elevato per la cura della TVP di un ulteriore 75-80%. Il costo medio del trattamento di un'ulcera venosa è stato stimato in 7.900-10.000 \$ per paziente/anno, imputabile, oltre che al maggior ricorso a visite mediche e prescrizioni di farmaci e/o interventi chirurgici, alle giornate lavorative perse e alla perdita del posto di lavoro.

Ancora oggi permangono molte incertezze riguardo alla sua diagnosi, prevenzione e trattamento, con limitate evidenze disponibili e numerose aree di incertezza che determinano un'ampia eterogeneità nella diagnosi e nella terapia della Sindrome Post Trombotica nei diversi Paesi. Ancora oggi esistono profonde differenze nella varie esperienze riguardo per esempio la sorveglianza e la prevenzione dopo TVP.

Id Provider 4596

Id Evento 450090

Crediti ECM: 5

Ore formative: 5



Professione

Farmacista; podologo; psicologo; medico chirurgo; infermiere pediatrico; fisioterapista; infermiere

Discipline

Farmacista pubblico del ssn; farmacista territoriale; farmacista di altro settore; podologo; iscritto nell'elenco speciale ad esaurimento; psicoterapia; psicologia; angiologia; chirurgia generale; chirurgia vascolare; Medicina generale (medici di famiglia); infermiere pediatrico; fisioterapista; iscritto nell'elenco speciale ad esaurimento; infermiere.



Target

10.000 partecipanti



Programma

Modulo 1 | La Sindrome Post-Trombotica (SPT) dalle certezze...

Introduzione al tema

G. B. Agus

Definizione e fisiopatologia

A. Pieri

Approvazione diagnostica

E. Cervi

Evidenze e linee guida

S. U. Urso

Modulo 2 | ...alle controversie (pareri a confronto)

Terapia medica e prevenzione

G. Alongi

Terapia anticoagulante

A. Santoliquido

Le varici secondarie: quando e come trattarle

P. Pavei

Id Provider 4596

Id Evento 450090

Crediti ECM: 5

Ore formative: 5



Programma

Nuove tecniche endovascolari nel trattamento della trombosi venosa profonda

A. Ruffino

Trombectomie meccaniche

M. Lugli

Ricanalizzazione femoro-iliaco-cavale

D. Baccellieri

Il trattamento invasivo della TVP ilio-femorale acuta. Analisi retrospettiva

A. Robaldo

Modulo 3 | ...e il paziente?

L'ambulatorio vulnologico

A. Poli

Le associazioni di pazienti

C. Novali